

十、香蕉假莖象鼻蟲

學名：*Odoiporus longicollis* (Oliver)

英名：Banana stem weevil

生活習性：

一年生發生四世代以上，以成蟲或幼蟲越冬。成蟲產卵於香蕉假莖組織內，卵經3~5日孵化；幼蟲經25~27日老熟在莖內作繭化蛹，蛹經3~5日羽化為成蟲。

危害特徵：幼蟲蛀食假莖內，被害假莖汁液外流而枯折，香蕉果梗及葉片主脈亦可被害。

防除方法：任選下表一種藥劑防除

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
1.成蟲 40%三落松乳劑 (Triazophos)	0.5公升	1,600	1.以香蕉假莖剪成約40公分左右的片斷，剝開一半重疊6至8片，置於蕉園，每分地五處，經五天引誘，如發現有5至10隻成蟲時開始施藥一次。 2.施藥時，自葉鞘至假莖部位均須施藥，每株施用稀釋液300~500公撮。	經常清理蕉園，並割除枯葉，砍碎老株。
40.8%陶斯松乳劑 (Chlorpyrifos)	0.27公升	1,000	每株注射150公撮，可兼防治幼蟲。	1.採收前1個月停止施藥。 2.不得注入假莖中央三分之一部份。 3.應由技術人員現場指導方可使用。
40.8%陶斯松 水基乳劑 (Chlorpyrifos)	0.27公升	1,000	每株注射150公撮，可兼防治幼蟲。	1.採收前1個月停止施藥。 2.不得注入假莖中央三分之一部份。 3.應由技術人員現場指導方可使用。