

二、榴槿蜜粉介殼蟲類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
24.7%賽速洛寧膠囊水懸混劑* (Thiamethoxam + lambda-cyhalothrin)	0.3-0.5 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
20%亞滅培水溶性粉劑* (Acetamiprid)	0.4-0.8 公斤	2,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
40.8%陶斯松水基乳劑* (Chlorpyrifos)	0.7-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
40.8%陶斯松乳劑* (Chlorpyrifos)	0.7-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
75%陶斯松水分散性粒劑* (Chlorpyrifos)	0.3-0.7 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
16%可尼丁水溶性粒劑* (Clothianidin)	0.7-1.3 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
20%達特南水溶性粒劑* (Dinotefuran)	0.5-1 公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前15天停止施藥。
50%撲滅松乳劑* (Fenitrothion)	1-2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
50%芬殺松乳劑* (Fenthion)	1-2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
100g/L賜派滅水懸劑* (Spirotetramat)	0.7-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。

*延伸使用藥劑