

四、可可椰子扁金花蟲（紅胸葉蟲）

學名：*Brontispa longissima* Gestro

英名：Coconut leaf beetle, Coconut hispine beetle

危害作物：可可椰子、油椰子、糠榔、檳榔、大王椰子、亞力山大椰子、岩海棗等。

生活習性：

卵產在未展開之新葉上，呈扁平長橢圓形、表面密被龜甲狀的點刻。幼蟲及成蟲均食害未展開扇摺狀新葉的上、下表皮及葉肉，食痕呈條狀。近生長點較緊密葉片或已展開之葉片不被危害。

危害特徵：被危害部份變褐色並有褐色粉狀排泄物，其後逐漸乾枯。

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
50%安丹 可濕性粉劑 (Propoxur)		1,000	每二個月施藥一次。	1.以高壓動力噴霧機噴注於心葉處，已展開葉片不必噴施。 2.應加展著劑以增強藥效。 3.其他椰子扁金花蟲，亦可用同一方法防除。 4.魚塭周圍避免使用。 5.採收前10天停止施藥。
40.8%陶斯松 乳劑 (Chlorpyrifos)		1,000	每二個月施藥一次。	1.以高壓動力噴霧機噴注於心葉處，已展開葉片不必噴施。 2.採收前5天停止用藥。