

六、椰子犀角金龜(臺灣兜蟲)

學名：*Oryctes rhinoceros* (Linnaeus)

英名：Rhinoceros beetle, Asiatic rhinoceros beetle

危害作物：

大多數棕櫚科植物(包括可可椰子、檳榔、枕榔、扇柎、金絲柎、油椰子、蒲葵、西谷椰子、尼帕椰子、尼榔椰子、海棗等)、露兜樹、車輪芋、鳳梨、香蕉、柑桔等。

生活習性：

本蟲是本省可可椰子重要害蟲之一，成蟲產卵於枯腐之椰樹幹中，或腐植堆，如堆肥、廐肥等處，幼蟲以腐植質為食，化蛹於原處，羽化之成蟲飛飛往椰子樹危害。

危害特徵：

成蟲在樹幹上或葉柄基部作不規則之穿孔，被害部常因風吹而折斷；如危害生長點，則無新葉抽出，而致樹株枯死。

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
5%安丹粒劑 (Propoxur)	20-40 公克 (每株)	1,000	1.將藥劑均勻撒佈於近 心葉之葉脈。 2.輕微或中等被害地 區，每3個月處理一 次，被害嚴重地區， 則2個月施藥一次。	