

紅龍果

一、紅龍果炭疽病

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
500g/L三氟派瑞 水懸劑* (Fluopyram + Trifloxystrobin)	0.3-0.5 公升	4,000	謝花幼果期開始施藥， 必要時隔14天施藥一次。 。	採收前18天停止施藥。
325g/L亞托待克利 水懸劑* (Azoxystrobin + Difenoconazole)		3,000	開花初期開始施藥，以後 每隔7天施藥一次，連續 四次；接著每隔14天施藥 一次，至套袋為止。	採收前21天停止施藥。
70%甲基多保淨 可濕性粉劑* (Thiophanate- methyl)	0.8-1.6 公斤	1,000	開花初期開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
40%甲基多保淨 水懸劑* (Thiophanate- methyl)	1.6-3.2 公升	500	開花初期開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
23.6%百克敏乳劑* (Pyraclostrobin)	0.3-0.5 公升	3,000	開花初期開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
40%克熱淨 (烷苯磺酸鹽) 可濕性粉劑* (Iminoctadine tris (albesilate))	0.5-1.1 公斤	1,500	開花初期開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
25.9%得克利 水基乳劑* (Tebuconazole)	0.5-1.1 公升	1,500	開花初期開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
80%免得爛 水分散性粒劑* (Metiram)	1.6-3.2 公斤	500	開花初期開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
50%三氟敏 水分散性粒劑* (Trifloxystrobin)	0.2-0.4 公斤	4,000	開花初期開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前18天停止施藥。
62.5%賽普護汰寧 水分散性粒劑* (Cyprodinil + Fludioxonil)	0.4-0.8 公斤	2,000	開花初期開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
23%亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin)	0.4-0.8 公升	2,000	開花初期開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
10%亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin)	1-2公升	800	開花初期施藥，必要時 隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
50%亞托敏 水分散性粒劑* (Azoxystrobin)	0.2-0.4 公斤	4,000	開花初期施藥，必要時 隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。

*延伸使用藥劑

TACTRI