

二、紅龍果粉介殼蟲類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
40%三落松乳劑* (Triazophos)	0.5-1公升	1,000	害蟲發生時施藥一次。	採收前14天停止施藥。
24.7%賽速洛寧 膠囊水懸混劑* (lambda-Cyhalothrin + Thiamethoxaml)	0.2-0.4 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 。	採收前9天停止施藥。
20%達特南 水溶性粒劑* (Dinotefuran)	0.4-0.8 公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔10天施藥一次。 。	採收前10天停止施藥。
100g/L賜派滅 水懸劑* (Spirotetramat)	0.5-1.1 公升	1,500	害蟲發生時全株均勻施 藥一次。	採收前10天停止施藥。
40.8%陶斯松乳劑* (Chlorpyrifos)	0.4-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔10天施藥一次。 。	採收前15天停止施藥。
40.8%陶斯松 水基乳劑* (Chlorpyrifos)	0.4-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔10天施藥一次。 。	採收前15天停止施藥。

*延伸使用藥劑