

葡 萄

一、葡 萄 銹 病

學名：*Phakopsora ampelopsidis* Diet. et Syd.

英名：Rust

病徵：

葉背呈現多數小突起，秋季時產生黃褐色粉末狀物為本菌夏孢子，病斑多時可引起落葉。

傳播途徑：以夏孢子為本病之感染源。

防治方法：任選下表一種藥劑防除

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
500g/L 氟殺克敏水懸劑 (Fluxapyroxad + Pyraclostrobin)	0.2公升	6,000	病害發生初期開始施藥，每隔10天施用一次，連續三次。	採收前12天停止施藥。
50%三氟敏水分散性粒劑 (Trifloxystrobin)	0.2公斤	6000	發病初期開始施藥，以後每隔7-10天施藥一次，連續三次。	1.採收前18天停止用藥。 2.對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
75%四氯異苯腈可濕性粉劑 (Chlorothalonil)		600	發病初期開始噴藥，每隔10天噴藥一次，連續四次。	1.採收前30天停止用藥。 2.本藥劑試驗時加展著劑「出來通CS-7」3000倍。
75%四氯異苯腈水分散性粒劑 (Chlorothalonil)		600	發病初期開始噴藥，每隔10天噴藥一次，連續四次。	1.採收前30天停止用藥。 2.本藥劑試驗時加展著劑「出來通CS-7」3000倍。
75%嘉保信可濕性粉劑 (Oxycarboxin)	1公斤	1500	發病初期開始每隔7天施藥一次。	採收前20天停止施藥。
75%貝芬普寧可濕性粉劑 (Carbendazim + Mepronil)	0.8公斤	1500	發病初期開始施藥，以後每隔10天施藥一次。	1.本藥劑試驗時加展著劑「全透力」1000倍或「CS-7」3,000倍。 2.採收前18天停止施藥。
25%克熱淨溶液 (Quazatine)	1.5-1.9公升	800	發病初期開始每隔10天施藥一次，連續四次。	1.本藥劑試驗時添加展著劑「出來通CS-7」3,000倍。 2.採收前21天停止用藥。
40%四氯異苯腈水懸劑* (Chlorothalonil)		300	發病初期開始噴藥，每隔10天噴藥一次，連續四次。	採收前30天停止用藥。

*延伸使用藥劑