

## 十、葡 萄 毒 蛾 類

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda- Cyhalothrin)	0.4-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前20天停止施藥。
2.46%賽洛寧 膠囊懸著液* (lambda- Cyhalothrin)	0.4-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前20天停止施藥。
2.5%賽洛寧 微乳劑* (lambda- Cyhalothrin)	0.4-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前20天停止施藥。
5%賽洛寧 水分散性粒劑* (lambda- Cyhalothrin)	0.2-0.5 公升	3,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前20天停止施藥。
1%賽洛寧 可濕性粉劑* (lambda- Cyhalothrin)	1.1-2.3 公升	700	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前20天停止施藥。
2.8%賽洛寧水懸劑* (lambda- Cyhalothrin)	0.4-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前20天停止施藥。
25%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	1-1.2 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	採收前8天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粒劑* (Methomyl)	0.68-0.9 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	採收前8天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	0.68-0.9 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	採收前8天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑- 水溶性袋裝* (Methomyl)	0.68-0.9 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	採收前8天停止施藥。

\*延伸使用藥劑