

十四、葡萄咖啡木蠹蛾

學名：*Zeuzera coffeae* Nietner

英名：Red coffee borer

生活習性：

中部地區年發生兩世代，以4~5月發生密度最高，9~10月次之。成蟲產卵於葉柄基部或枝幹表面隙縫間，每20-30粒一處，每一雌蟲可產300-800粒。初孵化幼蟲由穗軸，嫩枝或腋芽間蛀入蔓內危害，幼蟲有遷移他枝繼續蛀食之習性。老熟幼蟲化蛹於食孔中。

危害特徵：幼蟲蛀食於蔓內木質部，致枝條枯萎，糞便由進入孔排出。

防除方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
2.8%第滅寧乳劑 (Deltamethrin)	0.5公升	2000	害蟲發生時，每隔15天施藥一次，連續三次。	採收前15天停止施藥。
2.8%第滅寧水基乳劑 (Deltamethrin)	0.5公升	2000	害蟲發生時，每隔15天施藥一次，連續三次。	採收前15天停止施藥。
2.5%賽洛寧微乳劑 (lambda-Cyhalothrin)	1公升	1000	成蟲發生時，每隔15天施藥一次，連續三次。	採收前20天停止施藥。
2.46%賽洛寧膠囊懸著液 (lambda-Cyhalothrin)	1公升	1000	成蟲發生時，每隔15天施藥一次，連續三次。	採收前20天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑 (lambda-Cyhalothrin)	1公升	1000	成蟲發生時，每隔15天施藥一次，連續三次。	採收前20天停止施藥。
2.8%賽洛寧水懸劑 (lambda-Cyhalothrin)	1公升	1000	成蟲發生時，每隔15天施藥一次，連續三次。	採收前20天停止施藥。