

四、番 石 榴 疫 病

藥 劑 名 稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施 藥 方 法	注 意 事 項
60.8%氟比拔克 水懸劑* (Fluopicolide + Propamocarb hydrochloride)	1.2-2 公升	1,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前30天停止施藥。
80%福賽快得寧 可濕性粉劑* (Fosetyl-Al + oxine-copper)	1-1.7 公斤	1,200	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次，至套袋前為止。	採收前6天停止施藥。
9.4%賽座滅水懸劑* (Cyazofamid)	0.4-0.67 公升	3,000	小果期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
18.7%達滅克敏 水分散性粒劑* (Pyraclostrobin + Dimethomorph)	1.2-2.0 公斤	1,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次，至套袋前為止。	採收前15天停止施藥。
52.5%凡殺克絕 水分散性粒劑* (Famoxadone + Cymoxanil)	0.8-1.3 公斤	1,500	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次，至套袋前為止。	採收前12天停止施藥。
27.12%三元硫酸銅 水懸劑* (Tribasic copper sulfate)	1.5-2.5 公升	800	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次，至套袋前為止。	採收前6天停止施藥。

*延伸使用藥劑