

七、番 石 榴 葉 蟬 類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
10%賽速安 水溶性粒劑* (Thiamethoxam)	0.5-0.75 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.避免於開花期使用。
42%益洛寧 可濕性粉劑* (Lambda-cyhalothrin + Phosmet)	0.6-1 公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
20%亞滅培 水溶性粉劑* (Acetamiprid)	0.3-0.5 公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
20%達特南 水溶性粒劑* (Dinotefuran)	0.4-0.7 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天後施藥一次。	採收前9天停止施藥。
2.9%貝他賽扶寧 乳劑* (Beta-cyfluthrin)	0.8-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天後施藥一次。	採收前6天停止施藥。
25%賽速安 水溶性粒劑* (Thiamethoxam)	0.2-0.3 公斤	7,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天後施藥一次。	採收前6天停止施藥。
9.6%益達胺溶液* (Imidacloprid)	0.4-0.7 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天後施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.避免施用於生長勢弱之幼苗，以免發生藥害。
9.6%益達胺 水懸劑* (Imidacloprid)	0.4-0.7 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天後施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.避免施用於生長勢弱之幼苗，以免發生藥害。
40%加保福化利 可濕性粉劑* (tau-Fluvalinate + Carbaryl)	0.6-1 公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天後施藥一次。	採收前18天停止施藥。
2.8%畢芬寧乳劑* (Bifenthrin)	0.6-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天後施藥一次。	採收前9天停止施藥。
2.5%畢芬寧水懸劑* (Bifenthrin)	0.6-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天後施藥一次。	採收前9天停止施藥。
3%亞滅寧 水基乳劑* (Alpha-cypermethrin)	1.2-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天後施藥一次。	採收前6天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
3%亞滅寧乳劑* (Alpha-cypermethrin)	1.2-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天後施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.5%賽洛寧微乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.3-0.5 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天後施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.46%賽洛寧膠囊懸著液* (lambda-Cyhalothrin)	0.3-0.5 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天後施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.3-0.5 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天後施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.8%賽洛寧水懸劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.3-0.5 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天後施藥一次。	採收前6天停止施藥。

*延伸使用藥劑