

## 十一、番 石 榴 薊 馬 類

### 腹鉤薊馬

學名：*Rhipiphorothrips cruentatus* Hood

英名：Grapevine thrips, Mango thrips

危害作物：葡萄、椶果、蓮霧、番石榴等。

生活習性：

本蟲主要發生於葉部及果實上，成蟲、若蟲大多聚集於葉背，銹傷葉片及果實表皮，吸食汁液危害。

危害特徵：

被害部初呈銀色小斑點，後轉為褐色疤痕。嚴重時葉片銹化、乾枯而捲曲，果實形成粗糙傷疤而發育不良，影響樹勢生長及產量。而本蟲分泌之排泄物亦會污染葉片，對光合作用及生育都會有影響。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
2.5%賽洛寧微乳劑 (lambda-Cyhalothrin)	1.5-2.0 公升	1,000	害蟲發生時，施藥一次。	1.防治腹鉤薊馬。 2.採收前6天停止施藥。
2.46%賽洛寧膠囊懸著液 (lambda-Cyhalothrin)	1.5-2.0 公升	1,000	害蟲發生時，施藥一次。	1.防治腹鉤薊馬。 2.採收前6天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑 (lambda-Cyhalothrin)	1.5-2.0 公升	1,000	害蟲發生時，施藥一次。	1.防治腹鉤薊馬。 2.採收前6天停止施藥。
2.8%賽洛寧水懸劑 (lambda-Cyhalothrin)	1.5-2.0 公升	1,000	害蟲發生時，施藥一次。	1.防治腹鉤薊馬。 2.採收前6天停止施藥。
48.34%丁基加保扶乳劑 (Carbosulfan)	1.4-1.7 公升	1,200	害蟲發生時，施藥一次。	1.防治腹鉤薊馬。 2.採收前12天停止施藥。
3%亞滅寧水基乳劑 (alpha-Cypermethrin)	1.5-2.0 公升	1,000	害蟲發生時，施藥一次。	1.防治腹鉤薊馬。 2.採收前6天停止施藥。
3%亞滅寧乳劑 (alpha-Cypermethrin)	1.5-2.0 公升	1,000	害蟲發生時，施藥一次。	1.防治腹鉤薊馬。 2.採收前6天停止施藥。
2.8%第滅寧水基乳劑 (Deltamethrin)	1.5-2.0 公升	1,000	害蟲發生時，施藥一次。	1.防治腹鉤薊馬。 2.採收前6天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
2.8%第滅寧乳劑 (Deltamethrin)	1.5-2.0 公升	1,000	害蟲發生時，施藥一次。	1.防治腹鉤薊馬。 2.採收前6天停止施藥。
100g/L賜派滅 水懸劑* (Spirotetramat)	0.8-1.3 公升	1,500	害蟲發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
42%益洛寧 可濕性粉劑* (Lambda- cyhalothrin + Phosmet)	0.8-1.3 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
20%亞滅培 水溶性粉劑* (Acetamiprid)	0.3-0.5 公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
28.8%益達胺溶液* (Imidacloprid)	0.2-0.3 公升	6,000	害蟲發生時開始施藥，必要時7天後施藥一次。	採收前12天停止施藥。
9.6%益達胺溶液* (Imidacloprid)	0.6-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時7天後施藥一次。	採收前9天停止施藥。
9.6%益達胺 水懸劑* (Imidacloprid)	0.6-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時7天後施藥一次。	採收前9天停止施藥。
20%達特南 水溶性粒劑* (Dinotefuran)	0.4-0.7 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時7天後施藥一次。	採收前9天停止施藥。
50%陶斯松 水基乳劑* (Chlorpyrifos)	0.6-1公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時7天後施藥一次。	採收前6天停止施藥。
50%陶斯松 可濕性粉劑* (Chlorpyrifos)	0.6-1公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時7天後施藥一次。	採收前6天停止施藥。
10%克凡派水懸劑* (Chlorfenapyr)	0.8-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時7天後施藥一次。	採收前12天停止施藥。
40%加保福化利 可濕性粉劑* (Carbaryl + tau-Fluvalinate)	0.6-1 公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時7天後施藥一次。	採收前12天停止施藥。
25%福化利乳劑* (tau-Fluvalinate)	0.4-0.7 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時7天後施藥一次。	採收前18天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
20%覆滅蟎 水溶性粉劑* (Formetanate)	1.5-3.3 公斤	600-800	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
11.7%賜諾特 水懸劑* (Spinetoram)	0.4-0.6 公升	3,200	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
5.87%賜諾特 水懸劑* (Spinetoram)	0.8-1.3 公升	1,600	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。

\*延伸使用藥劑

TACTRI