

八、楊 桃 薊 馬 類

藥 劑 名 稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施 藥 方 法	注 意 事 項
11.7%賜諾特 水懸劑* (Spinetoram)	0.3-0.5 公升	3,200	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
5.87%賜諾特 水懸劑* (Spinetoram)	0.5-1 公升	1,600	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
20%覆滅蟎 水溶性粉劑* (Formetanate)	1-2.7 公斤	600-800	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
100g/L賜派滅 水懸劑* (Spirotetramat)	0.5-1.1 公升	1,500	害蟲發生初期開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
40%加保福化利 可濕性粉劑* (Carbaryl + tau-Fluvalinate)	0.4-0.8 公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
42%益洛寧 可濕性粉劑* (Lambda- cyhalothrin + Phosmet)	0.5-1.1 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
20%亞滅培 水溶性粉劑* (Acetamiprid)	0.2-0.4 公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
28.8%益達胺溶液* (Imidacloprid)	0.1-0.3 公升	6,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時7天後施藥一次。	採收前12天停止施藥。
9.6%益達胺溶液* (Imidacloprid)	0.4-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時7天後施藥一次。	採收前9天停止施藥。
9.6%益達胺水懸劑* (Imidacloprid)	0.4-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時7天後施藥一次。	採收前9天停止施藥。
20%達特南 水溶性粒劑* (Dinotefuran)	0.3-0.5 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時7天後施藥一次。	採收前9天停止施藥。
50%陶斯松 水基乳劑* (Chlorpyrifos)	0.4-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時7天後施藥一次。	採收前12天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
50%陶斯松 可濕性粉劑* (Chlorpyrifos)	0.4-0.8 公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時7天後施藥一次。 。	採收前12天停止施藥。
10%克凡派水懸劑* (Chlorfenapyr)	0.5-1.1 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時7天後施藥一次。 。	採收前12天停止施藥。
25%福化利乳劑* (tau-Fluvalinate)	0.3-0.5 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時7天後施藥一次。 。	採收前18天停止施藥。
2.8%第滅寧 水基乳劑* (Deltamethrin)	0.5-1.1 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時7天後施藥一次。 。	採收前6天停止施藥。
2.8%第滅寧乳劑* (Deltamethrin)	0.5-1.1 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時7天後施藥一次。 。	採收前6天停止施藥。
2.4%第滅寧水懸劑* (Deltamethrin)	0.5-1.1 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時7天後施藥一次。 。	採收前6天停止施藥。
3%亞滅寧 水基乳劑* (Alpha- cypermethrin)	0.8-1.6 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時7天後施藥一次。 。	採收前6天停止施藥。
3%亞滅寧乳劑* (Alpha- cypermethrin)	0.8-1.6 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時7天後施藥一次。 。	採收前6天停止施藥。

*延伸使用藥劑