

十、楊桃花姬捲葉蛾（楊桃果實蛀蟲）

學名：*Eucosma notanthes* Meyrick

英名：Carambola fruit borer

別名：楊桃果實蛀蟲

生活習性：

年發生八世代，以7月至11月發生最多。成蟲多喜在清晨及傍晚時出來活動、交尾與產卵。成蟲將卵散產於楊桃果實及葉片上，剛產的卵呈白點狀，約經1~2日，卵粒中間出現紅點，再經2至3日卵即孵出幼蟲。初孵化幼蟲經爬行尋找寄主後，鑽入果肉內蛀食，蛀孔外可見排出的褐色顆粒狀蟲糞。老熟幼蟲大部鑽出果實，於乾枯的枝葉、樹幹縫隙或果實內結繭化蛹，經8~15日羽化為成蟲。

危害特徵：果實表面可見白色或紅點之卵粒、或果實上之蟲孔排出褐色蟲糞。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
2.8%第滅寧乳劑 (Deltamethrin)	0.7-1.0 公升	1,500	1. 套袋楊桃：每隔7~10日施藥一次連續三~四次至果實達五公分長左右即行疏果套袋，套袋後不需再施藥。 2. 未套袋楊桃：於楊桃謝花後，每隔7~10日施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.8%第滅寧 水基乳劑 (Deltamethrin)	0.7-1.0 公升	1,500	1. 套袋楊桃：每隔7~10日施藥一次連續三~四次至果實達五公分長左右即行疏果套袋，套袋後不需再施藥。 2. 未套袋楊桃：於楊桃謝花後，每隔7~10日施藥一次。	採收前6天停止施藥。