

十五、楊桃葉蟎類

學名：*Panonychus citri* (McGregor)

英名：Citrus red mite

生活習性：

成蟎與若蟎均在葉面或葉背棲息吸汁危害，但不直接危害果實。在楊桃上危害之柑桔葉蟎體色不若在柑桔上之鮮紅或紫紅色，而呈現黃綠至黑綠之色澤。乾旱季節發生密度較高。

危害特徵：

被害葉部變為枯黃之密集斑點，嚴重者葉片呈枯黃色造成落葉，影響植株發育。

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
2.8%畢芬寧乳劑 (Bifenthrin)	1.2-1.5 公升	2,000	害蟎發生時，每隔7天施藥一次。	1.採收前9天停止用藥。 2.對水生物劇毒，水域禁用。
2.5%畢芬寧水懸劑 (Bifenthrin)	1.2-1.5 公升	2,000	害蟎發生時，每隔7天施藥一次。	1.採收前9天停止用藥。 2.對水生物劇毒，水域禁用。
1%密滅汀乳劑* (Milbemectin)	1.6-2.0 公升	1,500	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止用藥。
10%得芬瑞 可濕性粉劑* (Tebufenpyrad)	0.4-0.8 公斤	2,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
10%芬普寧 水懸劑* (Fenpropathrin)	0.8-1.6 公升	1,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
20%賽芬蟎 水懸劑* (Cyflumetofen)	0.4-0.8 公升	2,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
30%賜派芬水懸劑* (Spirodiclofen)	0.32-0.64 公升	2,500	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前15天停止施藥。
18.3%芬殺蟎水懸劑* (Fenazaquin)	0.27-0.53 公升	3,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
10%芬殺蟎乳劑* (Fenazaquin)	0.5-1.1 公升	1,500	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
15%芬殺蟎水懸劑* (Fenazaquin)	0.3-0.6 公升	2,500	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
46.5%愛殺松乳劑* (Ethion)	0.8-1.6 公升	800	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
46.5%愛殺松 水基乳劑* (Ethion)	0.8-1.6 公升	800	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
240g/L賜滅芬 水懸劑* (Spiromesifen)	0.4-0.8 公升	2,000	害蟎發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。

*延伸使用藥劑