

十、檬 果 葉 蟬 類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
30%撲芬松 水基乳劑 (Fenvalerate + Fenitrothion)	1.5公升	800	抽穗及開花初期發生害蟲危害時，施藥一次，必要時每隔10天施藥一次。	1.為保護採粉昆蟲及天敵，盛花期避免施藥。 2.施藥者應戴口罩、手套，以防藥液吸入體內及沾及皮膚。 3.採收前6天停止施藥。
30%撲芬松乳劑 (Fenvalerate + Fenitrothion)	1.5公升	800	抽穗及開花初期發生害蟲危害時，施藥一次，必要時每隔10天施藥一次。	1.為保護採粉昆蟲及天敵，盛花期避免施藥。 2.施藥者應戴口罩、手套，以防藥液吸入體內及沾及皮膚。 3.採收前6天停止施藥。
21.8%速殺氟 水懸劑 (Sulfoxaflor)	0.33-0.44 公升	3,600	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次，共二次。	採收前14天停止施藥。
25%賽速安 水溶性粒劑 (Thiamethoxam)	0.13-0.26 公斤	7,500	抽穗及開花初期施藥，必要時隔10天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
20%亞滅培 水溶性粉劑* (Acetamiprid)	0.2-0.5 公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
10%賽速安 水溶性粒劑* (Thiamethoxam)	0.33-0.65 公斤	3,000	抽穗及開花初期施藥，必要時隔10天施藥一次。	採收前6天停止施藥。

*延伸使用藥劑