

## 十二、椪 果 木 蝨

學名：*Microceropsylla nigra* (Crawford)

英名：Mango psyllid

危害作物：椪果

生活習性：

年發生數世代。成蟲產卵於幼葉上。孵化後若蟲分佈葉背主脈之兩側，以其口器吸取葉液。在田間常與螞蟻共棲。

危害特徵：分泌蜜露，誘發煤病妨礙光合作用。

防除方法：任選下表一種藥劑防除

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
40%納乃得 水溶性粒劑 (Methomyl)	1.13公斤	800	新梢期發生危害時每隔10天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑 (Methomyl)	1.13公斤	800	新梢期發生危害時每隔10天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
25%納乃得 水溶性粉劑 (Methomyl)	1.8公斤	500	新梢期發生危害時每隔10天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
99%礦物油乳劑* (Petroleum oils)	3-6.7 公升	300	害蟲發生時施藥，必要時隔7天施藥一次。	剩餘藥劑請勿重覆噴施，以免藥量過高，而發生藥害。
9.6%益達胺溶液* (Imidacloprid)	0.6-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥
9.6%益達胺水懸劑* (Imidacloprid)	0.6-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
25%布芬淨 可濕性粉劑* (Buprofezin)	0.6-1.3 公斤	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前15天停止施藥。
95%礦物油乳劑* (Petroleum oils)	3-6.7 公升	300	害蟲發生時施藥，必要時隔7天施藥一次。	剩餘藥劑請勿重覆噴施，以免藥量過高，而發生藥害。
97%礦物油乳劑* (Petroleum oils)	3-6.7 公升	300	害蟲發生時施藥，必要時隔7天施藥一次。	剩餘藥劑請勿重覆噴施，以免藥量過高，而發生藥害。

\*延伸使用藥劑

