

#### 十四、椽果毒蛾類、夜蛾類

藥劑名稱	每株每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
11.7%賜諾特* 水懸劑 (Spinetoram)	0.5-1 公升	2,000	害蟲發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.防治毒蛾類、夜蛾類。 2.採收前12天停止施藥。
2.5%賽洛寧微乳劑* (Lambda-cyhalothrin)	0.9-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.防治毒蛾類。 2.採收前9天停止施藥。
2.46%賽洛寧 膠囊懸著液* (Lambda-cyhalothrin)	0.9-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.防治毒蛾類。 2.採收前9天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑* (Lambda-cyhalothrin)	0.9-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.防治毒蛾類。 2.採收前9天停止施藥。
2.8%賽洛寧水懸劑* (Lambda-cyhalothrin)	0.9-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.防治毒蛾類。 2.採收前9天停止施藥。

\*延伸使用藥劑