

## 十七、檬 果 螟 蛾

學名：*Chlumetia transversa* (Walker)

英名：Mango shoot borer

危害作物：檬果

生活習性：

卵產於心葉嫩梢上，幼蟲蛀入花梢或嫩梢，在其中穿鑽隧道，當新梢萎凋後，幼蟲可再遷至其他新梢危害。一年約可發生四世代，10至11月間及2至3月間為其發生盛期。

危害特徵：使新梢萎凋，幼果脫落。

防除方法：任選下表一種藥劑防除

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
50%撲滅松乳劑 (Fenitrothion)	1-1.2 公升	1,000	1.自新梢抽出後，每10天施藥一次，連續施藥二次。 2.花梢抽出後，每10天施藥一次，連續施藥四次。	
20%撲滅松乳劑 (Fenitrothion)	2.5-3 公升	400		
50%芬殺松乳劑 (Fenthion)	1-1.2 公升	1,000		
85%加保利 可濕性粉劑 (Carbaryl)	1.5公斤	850		
30%撲芬松 水基乳劑 (Fenvalerate + Fenitrothion)		1,000	害蟲發生時開始施藥。	採收前6天停止施藥。
30%撲芬松乳劑 (Fenvalerate + Fenitrothion)		1,000	害蟲發生時開始施藥。	採收前6天停止施藥。