

八、荔枝癭蚧

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
85%加保利可濕性粉劑 (Carbaryl)	1.2-1.8 公斤	850	害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天施藥一次。	1.採收前15天停止施藥。 2.口服、皮膚及呼吸中等毒、具中度眼刺激性。 3.對魚輕毒、水生無脊椎生物劇毒及勿使用於「飲用水水源水質保護區」或「飲用水取水口一定距離內之地區」。
40.8%陶斯松乳劑 (Chlorpyrifos)	1.0-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天施藥一次。	1.採收前10天停止施藥。 2.口服及呼吸中等毒性、對皮膚具中度刺激性。 3.對水生物具毒性。
50%撲滅松乳劑 (Fenitrothion)	1.0-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天施藥一次。	1.採收前10天停止施藥。 2.中等口服及皮膚、呼吸劇毒性及具眼刺激性。 3.對水生物劇毒及勿使用於「飲用水水源水質保護區」或「飲用水取水口一定距離內之地區」。