

## 十一、荔枝黑角舞蛾

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
2.5%賽洛寧微乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.3-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.46%賽洛寧膠囊懸著液* (lambda-Cyhalothrin)	0.3-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.3-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
39.5%加保利水懸劑* (Carbaryl)	0.8-1.5 公升	800	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前15天停止施藥。
40%加保利水懸劑* (Carbaryl)	0.8-1.5 公升	800	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前15天停止施藥。
50%加保利可濕性粉劑* (Carbaryl)	0.6-1.2 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前15天停止施藥。
85%加保利可濕性粉劑* (Carbaryl)	0.4-0.7 公斤	1,700	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前15天停止施藥。

\*延伸使用藥劑