

### 十三、荔枝夜蛾類、毒蛾類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.3-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.46%賽洛寧 膠囊懸著劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.3-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.5%賽洛寧 微乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.3-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
5%賽洛寧 水分散性粒劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.2-0.3 公斤	3,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
1%賽洛寧 可濕性粉劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.9-1.7 公斤	700	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.8%賽洛寧 水懸劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.3-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。

\*延伸使用藥劑