

四、枇杷炭疽病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
10%亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin)	2-2.5 公升	800	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
50%亞托敏 水分散性粒劑* (Azoxystrobin)	0.4-0.5 公斤	4,000	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
39.5%扶吉胺 水懸劑* (Fluazinam)	0.8-1 公升	2,000	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
23%亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin)	0.8-1 公升	2,000	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
23.7%依普同 水懸劑* (Iprodione)	1.9-2.5 公升	800	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
40%克熱淨 (烷苯磺酸鹽) 可濕性粉劑* (Iminoctadine tris (albesilate))	1-1.3 公斤	1,500	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
25.9%得克利 水基乳劑* (Tebuconazole)	1-1.3 公升	1,500	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
50%三氟敏 水分散性粒劑* (Trifloxystrobin)	0.4-0.5 公斤	4,000	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前18天停止施藥。
50%克收欣 水分散性粒劑* (Kresoxim- methyl)	0.8-1 公斤	2,000	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。

*延伸使用藥劑

