

## 七、枇杷薊馬類

### 花薊馬

學名：*Thrips hawaiiensis* (Morgan)

英名：Flower thrips

### 花色薊馬

學名：*Thrips coloratus* Schmutz

英名：Loquat thrips

危害作物：枇杷、柑桔類、檬果、柚類、香蕉、桃、荔枝、龍眼、番石榴、梅、十字花科蔬菜、花卉等。

生活習性：

成蟲若蟲於開花期發生，主要為害花及幼果，危害花時常銼吸花瓣的汁液影響授粉及花器發育，危害幼果時促使果皮粗糙疤痕影響品質。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
2.5%賽洛寧微乳劑 (lambda-Cyhalothrin)	2公升	1,000	開花期每朵花平均五隻薊馬以上時施藥一次。	採收前3天停止施藥。
2.46%賽洛寧膠囊懸著液 (lambda-Cyhalothrin)	2公升	1,000	開花期每朵花平均五隻薊馬以上時施藥一次。	採收前3天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑 (lambda-Cyhalothrin)	2公升	1,000	開花期每朵花平均五隻薊馬以上時施藥一次。	採收前3天停止施藥。
2.8%賽洛寧水懸劑 (lambda-Cyhalothrin)	2公升	1,000	開花期每朵花平均五隻薊馬以上時施藥一次。	採收前3天停止施藥。
10%克凡派水懸劑* (Chlorfenapyr)	1-1.3公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天後施藥一次。	採收前15天停止施藥。
100g/L賜派滅水懸劑* (Spirotetramat)	1-1.3公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.於幼果期施用時，避免提高劑量。

\*延伸使用藥劑