

八、枇杷毒蛾類

小白紋毒蛾

學名：*Orgyia postica* (Walker)

英名：Small tussock moth

危害作物：枇杷、葡萄、柑桔、梨、檬果、茶、棉、蘿蔔、絲瓜及玉米等70多種作物。

生活習性：

每年發生8至9世代，成蟲羽化後因不善於飛行，交尾後卵即產於繭上，呈乳白色附有毒毛，初孵化幼蟲群集於枇杷嫩葉取食危害，而後逐漸分散，葉片被吃成缺刻，嚴重時只剩葉柄，老熟後移至老葉或枝條上結繭化蛹。

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
20%芬化利乳劑 (Fenvalerate)	0.6公升	3,000	害蟲發生時，施藥一次。	採收前3天停止施藥。
2.5%賽洛寧微乳劑 (lambda-Cyhalothrin)	1.8公升	1,000	害蟲發生時，施藥一次。	採收前3天停止施藥。
2.46%賽洛寧 膠囊懸著液 (lambda-Cyhalothrin)	1.8公升	1,000	害蟲發生時，施藥一次。	採收前3天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑 (lambda-Cyhalothrin)	1.8公升	1,000	害蟲發生時，施藥一次。	採收前3天停止施藥。
2.8%賽洛寧水懸劑 (lambda-Cyhalothrin)	1.8公升	1,000	害蟲發生時，施藥一次。	採收前3天停止施藥。
2.5%賽洛寧微乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	1.5-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.46%賽洛寧 膠囊懸著液* (lambda-Cyhalothrin)	1.5-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	1.5-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.8%賽洛寧水懸劑* (lambda-Cyhalothrin)	1.5-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
11.7%賜諾特水懸劑* (Spinetoram)	0.8-1 公升	2,000	害蟲發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。

*延伸使用藥劑

