

九、枇杷葉蟎類

學名：*Oligonychus litchii* Lo et Ho

英名：Litchi mite

生活習性：

此蟎僅在低海拔地區危害果樹，除枇杷外，亦可危害荔枝、梨、龍眼、番石榴、釋迦、酪梨、蓮霧、波羅蜜等熱帶果樹，成若蟎主要在枇杷葉片吸取汁液，通常由中老葉之葉柄基部開始危害，逐漸擴及全葉片；葉片表面呈灰黃色小斑點影響枇杷生育。

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
20%畢達本可濕性粉劑 (Pyridaben)	1-1.2 公斤	2,000	害蟎發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.具中度眼刺激性，對蜜蜂毒性高；對水生生物劇毒，禁用於水域、空中施藥或大面積施用。
20%畢達本水懸劑 (Pyridaben)	1-1.2 公升	2,000	害蟎發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.具中度眼刺激性，對蜜蜂毒性高；對水生生物劇毒，禁用於水域、空中施藥或大面積施用。
25%新殺蟎乳劑 (Bromopropylate)	4-4.8 公升	500	葉蟎密度每葉達5隻時施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對水生生物劇毒，禁用於水域、空中施藥或大面積施用。
39.5%扶吉胺水懸劑* (Fluazinam)	0.5-2.0 公升	1,500	害蟎發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
1%密滅汀乳劑* (Milbemectin)	1-1.3 公升	1,500	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
10%克凡派水懸劑* (Chlorfenapyr)	0.8-1.0 公升	2,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前15天停止施藥。

*延伸使用藥劑