

### 三、龍眼膠蟲

防治方法：任選下表一種藥劑防治

| 藥劑名稱                          | 每公頃每次施藥量 | 稀釋倍數(倍) | 施藥方法  | 注意事項  |
|-------------------------------|----------|---------|---|---|
| 20%大滅松乳劑*<br>(Dimethoate)     |          | 450     | 1.在冬令世代(1~2月),於若蟲固定前施藥,每隔7天施藥一次,連續施藥2~3次。<br>2.可加入95%礦物油150倍混合噴施。 | 1.施藥防治之前先採折枯枝及危害嚴重枝燒燬。<br>2.儘量使用動力噴霧機以增加防治效力。<br>3.樹勢衰弱時切勿混用礦物油。                  |
| 44%大滅松乳劑*<br>(Dimethoate)     |          | 1,000   | 1.在冬令世代(1~2月),於若蟲固定前施藥,每隔7天施藥一次,連續施藥2~3次。<br>2.可加入95%礦物油150倍混合噴施。 | 1.施藥防治之前先採折枯枝及危害嚴重枝燒燬。<br>2.儘量使用動力噴霧機以增加防治效力。<br>3.樹勢衰弱時切勿混用礦物油。                  |
| 20%撲滅松乳劑*<br>(Fenitrothion)   |          | 400     | 1.在冬令世代(1~2月),於若蟲固定前施藥,每隔7天施藥一次,連續施藥2~3次。<br>2.可加入95%礦物油150倍混合噴施。 | 1.施藥防治之前先採折枯枝及危害嚴重枝燒燬。<br>2.儘量使用動力噴霧機以增加防治效力。<br>3.樹勢衰弱時切勿混用礦物油。<br>4.採收前10天停止施藥。 |
| 50%撲滅松乳劑*<br>(Fenitrothion)   |          | 1,000   | 1.在冬令世代(1~2月),於若蟲固定前施藥,每隔7天施藥一次,連續施藥2~3次。<br>2.可加入95%礦物油150倍混合噴施。 | 1.施藥防治之前先採折枯枝及危害嚴重枝燒燬。<br>2.儘量使用動力噴霧機以增加防治效力。<br>3.樹勢衰弱時切勿混用礦物油。<br>4.採收前10天停止施藥。 |
| 95%礦物油乳劑*<br>(Petroleum oils) |          | 150     | 害蟲發生時開始施藥。  |   |
| 97%礦物油乳劑*<br>(Petroleum oils) |          | 150     | 害蟲發生時開始施藥。  |   |
| 99%礦物油乳劑*<br>(Petroleum oils) |          | 150     | 害蟲發生時開始施藥。  |   |

\*延伸使用藥劑