

二十、桑樹夜蛾類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
22.5%陶斯松乳劑* (Chlorpyrifos)	0.8-1.6 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
25%陶斯松 可濕性粉劑* (Chlorpyrifos)	0.8-1.6 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
40.8%陶斯松乳劑* (Chlorpyrifos)	0.4-0.9 公升	1,800	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
40.8%陶斯松 水基乳劑* (Chlorpyrifos)	0.4-0.9 公升	1,800	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
44.9%陶斯松乳劑* (Chlorpyrifos)	0.4-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
50%陶斯松 水基乳劑* (Chlorpyrifos)	0.4-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
50%陶斯松 可濕性粉劑* (Chlorpyrifos)	0.4-0.8 公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。

*延伸使用藥劑