

五、柑桔類褐色蒂腐病（黑點病）

學名：*Diaporthe citri* (Faw.) Wolf.

英名：Melanose, Stem ent rot

病徵：

葉片、嫩枝及果實皆可被害，形成突出的小黑點。病菌多時果皮上形成淚斑或赤褐色泥塊狀病斑，果實著色後，點斑四周仍呈綠色。

傳播途徑：

被害枝枯上形成的孢子隨雨水感染組織為唯一的傳染源。因此減少清除及燒燬枯枝對消滅本病原極為重要。

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
50%三氟敏 水分散性粒劑 (Trifloxystrobin)		10,000	自謝花後開始施藥，以後每隔21天施藥一次，連續四次。	1.採收前14天停止施藥。 2.對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
56%貝芬硫醌 可濕性粉劑 (Carbendazim + Dithianon)	2.5公斤	800	4~8月每1個月施藥一次。	採收前30天停止用藥。
22.7%腈硫醌 水懸劑 (Dithianon)	3公斤	1,000	4~8月每1個月施藥一次。	1.本藥劑試驗時加展著劑出來通(CS-7)3000倍。 2.採收前30天停止施藥。
80%鋅錳乃浦 可濕性粉劑 (Mancozeb)	4公斤	500	4~8月每1個月施藥一次。	1.本藥劑試驗時加展著劑出來通(CS-7)3000倍。 2.採收前40天停止施藥。
33%鋅錳乃浦 水懸劑 (Mancozeb)	4公升	500	4~8月每1個月施藥一次。	1.本藥劑試驗時加展著劑出來通(CS-7)3000倍。 2.採收前40天停止施藥。
40%腐絕 可濕性粉劑 (Thiabendazole)		500		果實包裝前使用。
50%三氟敏 水分散性粒劑* (Trifloxystrobin)	0.1-0.2 公升	10,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	金桔、金柑採收前27天停止施藥。其他柑桔類採收前21天停止施藥。

*延伸使用藥劑