

十六、柑桔類無殼介殼蟲類

(綠介殼蟲、半圓堅介殼蟲等)

綠介殼蟲

學名：*Coccus viridis* (Green)

英名：Green coffee scale, Green scale

生活習性：

成蟲、若蟲多寄生在葉背及葉柄或嫩枝上吸食汁危害，通常雄蟲少見，雌蟲行單性生殖，卵產於體軀下面。

危害特徵：

成蟲及若蟲分泌之蜜露及其所誘發之煤污菌覆蓋被害枝葉，阻礙光合作用，植株生育受阻。

半圓堅介殼蟲

學名：*Saissetia coffeae* (Walker)

英名：Hemispherical scale, Coffee helmet scale

生活習性：

成蟲、若蟲多寄生在枝葉及果實上，吸食汁液並分泌蜜露，誘引螞蟻及誘發煤病。

防除方法：任選下表一種藥劑防除

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
95%礦物油乳劑 (Petroleum oils)	21公升	95	與有殼介殼蟲類相同。	可同時防除紅蜘蛛。
50%馬拉松乳劑 (Malathion)	2.5公升	800	蟲害發生時施藥一次。	可同時防除蚜蟲類、粉介殼蟲類、木蝨、潛葉蛾等。
44%大滅松乳劑 (Dimethoate)	2公升	1,000	蟲害發生時施藥一次。	可同時防除蚜蟲類、粉介殼蟲類、木蝨、潛葉蛾等。
20%大滅松乳劑 (Dimethoate)	4.4公升	450		