

二十六、柑桔類薊馬類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
10%克凡派水懸劑* (Chlorfenapyr)	1-2.4公升	1,000	蟲害發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
9.6%益達胺水懸劑* (Imidacloprid)	0.7-1.6公升	1,500	蟲害發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前21天停止施藥。 2.勿用於花期。
9.6%益達胺溶液* (Imidacloprid)	0.7-1.6公升	1,500	蟲害發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前21天停止施藥。 2.勿用於花期。
18.2%益達胺水懸劑* (Imidacloprid)	0.3-0.8公升	3,000	蟲害發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前21天停止施藥。 2.勿用於花期。
28.8%益達胺溶液* (Imidacloprid)	0.2-0.5公升	4,500	蟲害發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前21天停止施藥。 2.勿用於花期。
11.7%賜諾特水懸劑* (Spinetoram)	0.3-0.6公升	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
5.87%賜諾特水懸劑* (Spinetoram)	0.5-1.2公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
25%丁基加保扶可濕性粉劑* (Carbosulfan)	2-4.8公斤	500	蟲害發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
40%丁基加保扶可濕性粉劑* (Carbosulfan)	1.25-3公斤	800	蟲害發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
2.5%賽洛寧微乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1.2公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
2.46%賽洛寧膠囊懸著劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1.2公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1.2公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
37%第滅達胺水懸劑* (Imidacloprid + Deltamethrin)	0.5-1.2公升	2,000	害蟲發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前30天停止施藥。 2.對蜜蜂毒性高，避免於作物開花時期使用。 3.對水生生物劇毒性，禁用於水生作物。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
43%佈飛松乳劑* (Profenofos)	1.5-2.0 公升	800	於花落後幼果期害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。

*延伸使用藥劑

TACTRI