

三十三、柑 桔 類 葉 蟎 類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
20%賽芬蟎水懸劑 (Cyflumetofen)	0.7公升	3,000	葉蟎發生初期施藥一次。	1.採收前15天停止施藥。 2.具皮膚及呼吸中等毒。
99%礦物油乳劑 (Petroleum oils)	3-4公升	500	葉蟎發生時施藥1次。	
25%二福隆 可濕性粉劑* (Diflubenzuron)	0.5-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前20天停止施藥。
20%三亞蟎乳劑* (Amitraz)	2公升	1,000	害蟎發病初期開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前18天停止施藥。
39.5%扶吉胺 水懸劑* (Fluazinam)	0.5-2.0 公升	1,500	害蟎發生初期開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
30%賜派芬水懸劑* (Spirodiclofen)	0.2-0.4 公升	5,000	葉蟎發生初期施藥一次。	金桔、金柑採收前12天停止施藥。 其他柑桔類採收前6天停止施藥。
18.3%芬殺蟎 水懸劑* (Fenazaquin)	0.3-0.8 公升	3,000	害蟎發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
10%芬殺蟎乳劑* (Fenazaquin)	0.7-1.6 公升	1,500	害蟎發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
15%芬殺蟎水懸劑* (Fenazaquin)	0.4-1.0 公升	2,500	害蟎發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
15%亞醌蟎水懸劑* (Acequinocyl)	0.66-1.6 公升	1,500	害蟎發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
95%礦物油乳劑* (Petroleum oils)	3-4公升	500	葉蟎發生時施藥1次， 必要時隔50天施藥一次， 連續一至二次。	
97%礦物油乳劑* (Petroleum oils)	3-4公升	500	葉蟎發生時施藥1次， 必要時隔50天施藥一次， 連續一至二次。	

*延伸使用藥劑

