

二、百 香 果 疫 病

藥 劑 名 稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施 藥 方 法	注 意 事 項
60.8%氟比拔克 水懸劑* (Fluopicolide + Propamocarb hydrochloride)	0.8-1.6 公升	1,000	病害發生初期開始施藥 ，必要時隔7天施藥一 次。	採收前14天停止施藥。
52.5%凡殺克絕 水分散性粒劑* (Famoxadone + cymoxanil)	0.5-1.1 公斤	1,500	病害發生初期開始施藥 ，必要時隔7天施藥一 次。	採收前12天停止施藥。
76.5%銅減達樂 可濕性粉劑* (Metalaxyl + Copper oxy- chloride)	0.8-1.6 公斤	1,000	病害發生初期開始施藥 ，必要時隔7天施藥一 次。	採收前12天停止施藥。
71.6%銅右減達樂 可濕性粉劑* (Metalaxyl-M + Copper oxychloride)	0.8-1.6 公斤	1,000	病害發生初期開始施藥 ，必要時隔7天施藥一 次。	採收前12天停止施藥。
純白鏈黴菌素 700PCU/g 水溶性粉劑* (Fermentation metabolites of <i>Streptomyces candidus</i> Y21007-2)	1-2公斤	800	雨季來臨前開始施藥， 每隔7天施藥一次，連 續六次。	

*延伸使用藥劑