

## 六、百 香 果 夜 蛾 類

藥 劑 名 稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施 藥 方 法	注 意 事 項
40%納乃得 水溶性粒劑* (Methomyl)	0.5-1.3 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
25%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	1-2公斤	800	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	0.5-1.3 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑- 水溶性袋裝* (Methomyl)	0.5-1.3 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
22.5%陶斯松乳劑* (Chlorpyrifos)	0.8-1.6 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前15天停止施藥。
25%陶斯松 可濕性粉劑* (Chlorpyrifos)	0.8-1.6 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前15天停止施藥。
40.8%陶斯松乳劑* (Chlorpyrifos)	0.4-0.9 公升	1,800	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前15天停止施藥。
40.8%陶斯松 水基乳劑* (Chlorpyrifos)	0.4-0.9 公升	1,800	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前15天停止施藥。
44.9%陶斯松乳劑* (Chlorpyrifos)	0.4-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前15天停止施藥。
50%陶斯松 水基乳劑* (Chlorpyrifos)	0.4-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前15天停止施藥。
50%陶斯松 可濕性粉劑* (Chlorpyrifos)	0.4-0.8 公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前15天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda- Cyhalothrin)	0.4-1公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
2.46%賽洛寧 膠囊懸著液* (lambda- Cyhalothrin)	0.4-1公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
2.5%賽洛寧 微乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.4-1公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
5%賽洛寧 水分散性粒劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.2-0.5 公斤	3,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
1%賽洛寧 可濕性粉劑* (lambda-Cyhalothrin)	1-2公斤	700	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
2.8%賽洛寧 水懸劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.4-1公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。

\*延伸使用藥劑