

八、百香果粉介殼蟲類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
20%達特南 水溶性粒劑* (Dinotefuran)	0.4-0.8 公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前10天停止施藥。 2.對蜜蜂毒性高，避免開花期使用。
50%撲滅松乳劑* (Fenitrothion)	0.3-0.6 公升	2,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前10天停止施藥。 2.避免施用於弱勢植株，以免發生藥害。
20%撲滅松乳劑* (Fenitrothion)	0.8-1.6 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前10天停止施藥。 2.避免施用於弱勢植株，以免發生藥害。
40%撲滅松 可濕性粉劑* (Fenitrothion)	0.4-0.8 公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前10天停止施藥。 2.避免施用於弱勢植株，以免發生藥害。
50%芬殺松乳劑* (Fenthion)	0.8-1.6 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.避免施用於弱勢植株，以免發生藥害。
50%芬殺松 水基乳劑* (Fenthion)	0.8-1.6 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.避免施用於弱勢植株，以免發生藥害。
24.7%賽速洛寧 膠囊水懸混劑* (lambda-Cyhalothrin + Thiamethoxaml)	0.2-0.4 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。

*延伸使用藥劑