

五、柿 白 粉 病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
8.93%溴克座 水懸劑* (Bromuconazole)	0.2-0.3 公升	4,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔10天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
42.37%滅芬農 水懸劑* (Metrafenone)	0.3-0.4 公升	4,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
11.8%護汰芬 水懸劑* (Flutriafol)	0.5-1 公升	2,000	發病初期開始施藥，必要時隔7-10天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.避免提高劑量，以免發生藥害。
30%賽福座 可濕性粉劑* (Triflumizole)	0.3-0.5 公斤	3,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
25%撲克拉乳劑* (Prochloraz)	0.2-0.3 公升	6,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
25%撲克拉 水基乳劑* (Prochloraz)	0.2-0.3 公升	6,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
40%邁克尼 可濕性粉劑* (Myclobutanil)	0.1公斤	12,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
35.15%銅合硫磺 水懸劑* (Sulfur + Copper oxychloride)	1.7-2.5 公升	600	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。

*延伸使用藥劑