

十二、柿夜蛾類、毒蛾類、黃刺蛾、刺蛾類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
70%得芬諾 可濕性粉劑* (Tebufenozide)	0.14-0.21 公斤	7,000	於幼果期開始施藥，每隔7天施藥一次。	1.採收前21天停止施藥。 2.僅防治夜蛾類。
5%賽洛寧 水分散性粒劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.3-0.4 公斤	3,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.防治夜蛾類、毒蛾類。
1%賽洛寧 可濕性粉劑* (lambda-Cyhalothrin)	1.4-2.1 公斤	700	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.防治夜蛾類、毒蛾類。
25%二福隆 可濕性粉劑* (Diflubenzuron)	0.5-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前28天停止施藥。 2.防治夜蛾類、毒蛾類。
11.7%賜諾特 水懸劑* (Spinetoram)	0.5-0.6 公升	2,000	害蟲發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.防治夜蛾類、毒蛾類、刺蛾類。
2.5%賽洛寧微乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	1-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.防治夜蛾類、毒蛾類、黃刺蛾。
2.46%賽洛寧 膠囊懸著液* (lambda-Cyhalothrin)	1-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.防治夜蛾類、毒蛾類、黃刺蛾。
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	1-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.防治夜蛾類、毒蛾類、黃刺蛾。
2.8%賽洛寧水懸劑* (lambda-Cyhalothrin)	1-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.防治夜蛾類、毒蛾類、黃刺蛾。

*延伸使用藥劑