

#### 四、桃 黑 星 病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
40%滅派林水懸劑* (Mepanipyrim)	0.3-0.5 公升	4,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
39.5%扶吉胺水懸劑* (Fluazinam)	0.3-0.7 公升	3,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
30%賽福座可濕性粉劑* (Triflumizole)	0.3-0.5 公斤	4,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
38%白列克敏水分散性粒劑* (Pyraclostrobin + Boscalid)	0.7-1.3 公斤	1,500	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前15天停止施藥。
50%三氟敏水分散性粒劑* (Trifloxystrobin)	0.2-0.4 公斤	5,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前18天停止施藥。
50%克收欣水分散性粒劑* (Kresoxim-methyl)	0.2-0.4 公斤	5,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。

\*延伸使用藥劑