

## 五、桃 白 粉 病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
30%賽福座 可濕性粉劑* (Triflumizole)	0.3-0.7 公斤	3,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
25%撲克拉乳劑* (Prochloraz)	0.2-0.3 公升	6,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
25%撲克拉 水基乳劑* (Prochloraz)	0.2-0.3 公升	6,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
22.8%菲克利腐絕 水懸劑* (Hexaconazole + Thiabendazole)	1-2公升	1,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
35.15%銅合硫磺 水懸劑* (Sulfur + Copper oxychloride)	1.7-3.3 公升	600	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
5%三泰隆 可濕性粉劑* (Triadimenol)	0.5-1 公斤	2,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
5%菲克利水懸劑* (Hexaconazole)	0.3-0.7 公升	3,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。

\*延伸使用藥劑