

## 六、桃 炭 疽 病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
10%亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin)	1.25-2.5 公升	800	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
50%亞托敏 水分散性粒劑* (Azoxystrobin)	0.25-0.5 公斤	4,000	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
39.5%扶吉胺 水懸劑* (Fluazinam)	0.5-1 公升	2,000	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
31.6%貝芬撲克拉 濃懸乳劑* (Prochloraz + Carbendazim)	0.3-0.7 公升	3,000	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
23%亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin)	0.5-1 公升	2,000	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
34.5%貝芬菲克利 水懸劑* (Carbendazim + hexaconazole)	0.3-0.7 公升	3,000	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
23.7%依普同 水懸劑* (Iprodione)	1.3-2.5 公升	800	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
40%克熱淨 (烷苯磺酸鹽) 可濕性粉劑* (Iminoctadine tris (albesilate))	0.7-1.3 公斤	1,500	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
25.9%得克利 水基乳劑* (Tebuconazole)	0.7-1.3 公升	1,500	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
50%三氟敏 水分散性粒劑* (Trifloxystrobin)	0.3-0.5 公斤	4,000	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前18天停止施藥。
50%克收欣 水分散性粒劑* (Kresoxim- methyl)	0.5-1 公斤	2,000	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
24.9%待克利乳劑* (Difenoconazole)	0.7-1.3 公升	1,500	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
24.9%待克利 水懸劑* (Difenoconazole)	0.7-1.3 公升	1,500	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
10%待克利 水分散性粒劑* (Difenoconazole)	1.3-2.5 公斤	800	開花初期開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。

\*延伸使用藥劑

TACTRI