

十三、桃 葉 蟬

學名：*Singapora shinshana* (Matsumura)

英名：Peach leafhopper

危害作物：桃

生活習性：

中部地區發生盛期六月至十一月，成蟲和若蟲棲於葉背取食，產卵於葉脈。一般而言在平地比山區發生密度高，喜食多種桃子如泰國桃、甜蜜桃、鶯歌桃、白鳳桃和水蜜桃。

危害特徵：若蟲、成蟲吸食葉片致葉片產生白斑，影響光合作用和提早落葉。

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
2.5%賽洛寧微乳劑 (lambda-Cyhalothrin)	2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，隔10天再施藥一次，共二次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對眼中度刺激性，對皮膚中度過敏性、強激性，對魚具毒性。
2.46%賽洛寧膠囊懸著液 (lambda-Cyhalothrin)	2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，隔10天再施藥一次，共二次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對眼中度刺激性，對皮膚中度過敏性、強激性，對魚具毒性。
2.8%賽洛寧乳劑 (lambda-Cyhalothrin)	2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，隔10天再施藥一次，共二次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對眼中度刺激性，對皮膚中度過敏性、強激性，對魚具毒性。
2.8%賽洛寧水懸劑 (lambda-Cyhalothrin)	2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，隔10天再施藥一次，共二次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對眼中度刺激性，對皮膚中度過敏性、強激性，對魚具毒性。
3%亞滅寧水基乳劑 (Alpha-cypermethrin)	2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，隔10天再施藥一次，共二次。	採收前6天停止施藥。
3%亞滅寧乳劑 (Alpha-cypermethrin)	2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，隔10天再施藥一次，共二次。	採收前6天停止施藥。