

#### 十四、桃夜蛾類、毒蛾類、刺蛾類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
11.7%賜諾特水懸劑* (Spinetoram)	0.5-1公升	2,000	害蟲發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.防治夜蛾類、毒蛾類、刺蛾類。
2.5%賽洛寧微乳劑* (lambda-cyhalothrin)	1-2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.防治夜蛾類、毒蛾類。
2.46%賽洛寧膠囊懸著液* (lambda-cyhalothrin)	1-2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.防治夜蛾類、毒蛾類。
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda-cyhalothrin)	1-2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.防治夜蛾類、毒蛾類。
2.8%賽洛寧水懸劑* (lambda-cyhalothrin)	1-2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.防治夜蛾類、毒蛾類。

\*延伸使用藥劑