

鳳 梨

一、鳳 梨 心 腐 病

學名：*Phytophthora* spp.

英名：Heart rot

病徵：

被害時心部組織變軟腐爛，呈褐色，與健部界線明顯，具臭味，手拔之易脫離，雨季時發生。

傳播途徑：被害組織產生白色菌絲體，上有孢囊，分化為游走子而成為感染源。

1. 浸苗處理：

藥劑名稱	每株每次施藥量	稀釋倍數(倍)	浸苗方法	注意事項
50%蓋普丹 可濕性粉劑 (Captan)		300~400	須浸苗1分鐘。	1. 具嚴重眼刺激性、呼吸中等毒。 2. 對水生物具毒性及勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。

2. 田間發病預防：

藥劑名稱	每株每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
50%蓋普丹 可濕性粉劑 (Captan)		400	鳳梨種植後20天，將藥液噴射或灌注於植株心部。	1. 具嚴重眼刺激性、呼吸中等毒。 2. 對水生物具毒性及勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
80%福賽得 可濕性粉劑 (Fosetyl-Al)	100公撮	200	浸苗及種植後20日灌藥一次或種後次日及20日後各灌一次。	
80%福賽得 水分散性粒劑 (Fosetyl-Al)	100公撮	200	浸苗及種植後20日灌藥一次或種後次日及20日後各灌一次。	
純白鏈黴菌素 700PCU/g 水溶性粉劑* (Fermentation metabolites of <i>Streptomyces candidus</i> Y21007-2)	100毫升	800	浸苗及種植後20日灌藥一次或種後次日及20日後各灌一次。	

藥劑名稱	每株每次 施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
60.8%氟比拔克 水懸劑* (Fluopicolide + Propamocarb hydrochloride)	1-2公升	1,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。

*延伸使用藥劑