

## 二、梅 白 粉 病

學名：*Podosphaera tridactyla* (Wallr.) de Bary

英名：Powdery mildew

病徵：

本病主要為害葉片、果實及幼嫩枝條，新葉被害時往往整葉被白色粉末覆蓋，導致葉片變小，扭曲而無法開展。老葉被害時，初期葉片上產生白色不規則形塊斑，病斑周圍呈放射狀向外擴展，嚴重時擴展至幼嫩枝條，不久白色粉末消失，果皮變為褐色革質，嚴重時出現裂紋，商品價值因而降低。

傳播途徑：

白粉病菌可以菌絲狀態在芽內越冬，第二年遇雨侵入初生幼嫩枝條，為第一次感染源。

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
40%邁克尼 可濕性粉劑 (Myclobutanil)		8,000	一月上旬謝花後開始施藥，以後每隔20天施藥一次，共四次。	採收前6天停止施藥。
37%護矽得乳劑 (Flusilazol)		8,000	一月上旬謝花後開始施藥，以後每隔20天施藥一次，共四次。	採收前21天停止施藥。
30%賽福座 可濕性粉劑* (Triflumizole)	0.4-0.6 公斤	3,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
35.15%銅合硫磺 水懸劑* (Sulfur + Copper oxychloride)	2-3公升	600	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。

\*延伸使用藥劑