

八、梨花枯病

防治方法：(緊急防治藥劑104.01)

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
68.8%多保鏈黴素 可濕性粉劑 (Thiophanate-methyl + Streptomycin)	1-1.6 公斤	1,000	休眠期及落花後使用，每隔7天施藥一次，共四次。	1.開花期以清除罹病枝葉為主，噴藥可能有大量落花情形。 2.仍宜先進行小面積施用，觀察無藥害再大面使用。
12.5%鏈黴素溶液 (Streptomycin)	1-1.6 公升	1,000	休眠期及落花後使用，每隔7天施藥一次，共四次。	1.開花期以清除罹病枝葉為主。 2.宜先進行小面積施用，無藥害再大面使用。
16.5%鏈土黴素 可濕性粉劑 (Streptomycin + Oxytetracycline)	0.7-1.1 公斤	1,500	休眠期及落花後每隔10天施藥一次，共五次。	1.開花期以清除罹病枝葉為主。 2.宜先進行小面積施用，無藥害再大面使用。
70%鹼性氯氧化銅 可濕性粉劑 (Copper oxychloride)	5-8公斤	200	梨樹休眠末期使用，每隔7天施藥一次，共四次。	1.作為冬季清園預防性施用藥劑。 2.本藥劑可能會對花及葉部造成藥害。