

紅毛丹

一、紅毛丹炭疽病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
500g/L三氟派瑞水懸劑* (Fluopyram + Trifloxystrobin)	0.2-0.4 公升	4,000	謝花幼果期開始施藥，必要時隔14天施藥一次。	採收前18天停止施藥。
325g/L亞托待克利水懸劑* (Azoxystrobin + Difenoconazole)		3,000	開花初期開始施藥，以後每隔7天施藥一次，連續四次；接著每隔14天施藥一次，至套袋為止。	採收前21天停止施藥。
70%甲基多保淨可濕性粉劑* (Thiophanate-methyl)	0.6-1.2 公斤	1,000	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
40%甲基多保淨水懸劑* (Thiophanate-methyl)	1.2-2.4 公升	500	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
23.6%百克敏乳劑* (Pyraclostrobin)	0.2-0.4 公升	3,000	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
40%克熱淨(烷苯磺酸鹽)可濕性粉劑* (Iminoctadine tris(albesilate))	0.4-0.8 公斤	1,500	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
25.9%得克利水基乳劑* (Tebuconazole)	0.4-0.8 公升	1,500	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
80%免得爛水分散性粒劑* (Metiram)	1.2-2.4 公斤	500	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
50%三氟敏水分散性粒劑* (Trifloxystrobin)	0.2-0.3 公斤	4,000	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前18天停止施藥。
62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑* (Cyprodinil + Fludioxonil)	0.3-0.6 公斤	2,000	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
23%亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin)	0.3-0.6 公升	2,000	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
10%亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin)	0.75-1.5 公升	800	開花初期施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
50%亞托敏 水分散性粒劑* (Azoxystrobin)	0.15-0.3 公斤	4,000	開花初期施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。

*延伸使用藥劑

TACTRI