

二、紅毛丹疫病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
52.5%凡殺克絕 水分散性粒劑* (Famoxadone + cymoxanil)	0.4-0.8 公斤	1,500	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
71.6%銅右滅達樂 可濕性粉劑* (Metalaxyl-M + Copper oxy- chloride)	0.8-1.6 公斤	1,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
76.5%銅滅達樂 可濕性粉劑* (Metalaxyl + Copper oxy- chloride)	0.6-1.2 公斤	1,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
60.8%氟比拔克 水懸劑* (Fluopicolide + Propamocarb hydrochloride)	0.6-1.2 公升	1,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
純白鏈黴菌素 700PCU/g 水溶性粉劑* (Fermentation metabolites of <i>Streptomyces candidus</i> Y21007-2)	0.8-1.5 公斤	800	雨季來臨前開始施藥，每隔7天施藥一次，連續六次。	

*延伸使用藥劑