

七、薔薇科果樹夜蛾類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.2-1.3 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.46%賽洛寧 膠囊懸著液* (lambda-Cyhalothrin)	0.2-1.3 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.5%賽洛寧 微乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.2-1.3 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
5%賽洛寧 水分散性粒劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.1-0.7 公升	3,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
1%賽洛寧 可濕性粉劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.6-3.6 公升	700	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.8%賽洛寧 水懸劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.2-1.3 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
25%二福隆 可濕性粉劑* (Diflubenzuron)	0.5-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前28天停止施藥。
19.7%得芬諾 水懸劑* (Tebufenozide)	0.5-0.75 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天再施藥一次。	採收前21天停止施藥。
70%得芬諾 可濕性粉劑* (Tebufenozide)	0.3-0.5 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天再施藥一次。	採收前21天停止施藥。

*延伸使用藥劑