

十一、薔薇科果樹葉蟎類

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
240g/L(24%w/v) 賜滅芬水懸劑 (Spiromesifen)	0.5公升	2,000	害蟎發生初期施藥一次，必要時隔14天再施藥一次。	採收前7天停止施藥。
50%芬佈賜 可濕性粉劑* (Fenbutatin-oxide)	0.6-1.7 公升	1,500	害蟎發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
15%亞醜蟎水懸劑* (Acequinocyl)	0.27-1.67 公升	1,500	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
18.3%芬殺蟎 水懸劑* (Fenazaquin)	0.3-0.8 公升	3,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
10%芬殺蟎乳劑* (Fenazaquin)	0.6-1.7 公升	1,500	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
15%芬殺蟎水懸劑* (Fenazaquin)	0.4-1.0 公升	2,500	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
50%芬佈賜 水懸劑* (Fenbutatin-oxide)	0.3-1.7 公升	1,500	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前10天停止施藥。 2.高溫下施用注意避免發生藥害。
20%賽芬蟎 水懸劑* (Cyflumetofen)	0.5-1.0 公升	2,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
30%賜派芬 水懸劑* (Spirodiclofen)	0.4-0.8 公升	2,500	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前15天停止施藥。

*延伸使用藥劑