

八、草莓薊馬類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
1%賽洛寧 可濕性粉劑* (lambda-Cyhalothrin)	1.1-2.9 公斤	700	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天(設施栽培12天)停止施藥。
5%賽洛寧 水分散性粒劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.2-0.6 公斤	3,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天(設施栽培12天)停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.4-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天(設施栽培12天)停止施藥。
2.8%賽洛寧水懸劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.4-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天(設施栽培12天)停止施藥。
2.46%賽洛寧 膠囊懸著液* (lambda-Cyhalothrin)	0.4-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天(設施栽培12天)停止施藥。
2.5%賽洛寧微乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.4-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天(設施栽培12天)停止施藥。
11.7%賜諾特 水懸劑* (Spinetoram)	0.1-0.3 公升	8,000	害蟲發生時施藥一次，必要時隔7天再施藥一次。	採收前6天停止施藥。
5.87%賜諾特 水懸劑* (Spinetoram)	0.2-0.6 公升	4,000	害蟲發生時施藥一次，必要時隔7天再施藥一次。	採收前6天停止施藥。
20%覆滅蟎 水溶性粉劑* (Formetanate)	2.5公斤	600	害蟲發生時施藥一次。	採收前7天停止施藥。
2.4%第滅寧水懸劑* (Deltamethrin)	0.7-0.8 公升	1,500	害蟲發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.8%第滅寧乳劑* (Deltamethrin)	0.7-0.8 公升	1,500	害蟲發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.8%第滅寧 水基乳劑* (Deltamethrin)	0.7-0.8 公升	1,500	害蟲發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
16%可尼丁 水溶性粒劑* (Clothianidin)	0.2-0.5 公斤	4,000	害蟲發生時施藥一次，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
5%賽滅寧微乳劑* (Cypermethrin)	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生時施藥一次，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前7天停止施藥。 2.避免於開花期使用。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
10%賽滅寧 可濕性粉劑* (Cypermethrin)	0.3-0.7 公斤	3,000	害蟲發生時施藥一次， 必要時隔7天施藥一次。	1.採收前7天停止施藥。 2.避免於開花期使用。
5%賽滅寧 可濕性粉劑* (Cypermethrin)	0.5-1.3 公斤	1,500	害蟲發生時施藥一次， 必要時隔7天施藥一次。	1.採收前7天停止施藥。 2.避免於開花期使用。
5%賽滅寧乳劑* (Cypermethrin)	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生時施藥一次， 必要時隔7天施藥一次。	1.採收前7天停止施藥。 2.避免於開花期使用。
5%賽滅寧 水基乳劑* (Cypermethrin)	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生時施藥一次， 必要時隔7天施藥一次。	1.採收前7天停止施藥。 2.避免於開花期使用。
25%福化利乳劑* (tau-Fluvalinate)	0.3-0.7 公升	3,000	害蟲發生時施藥一次， 必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
24%福化利 水基乳劑* (tau-Fluvalinate)	0.3-0.7 公升	3,000	害蟲發生時施藥一次， 必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
50%滅賜克 可濕性粉劑* (Methiocarb)	1-2.5 公斤	800	害蟲發生時施藥一次， 必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。

*延伸使用藥劑